

57年度
城内高等学校
生物研究部

1はじめに

この地球上には、さまざまの生物があります。

肉眼では見えないような微生物から巨大なクジラ、そして私達の生活を潤してくれる緑の植物まで。

これらの生物は、自然破壊という人間の作成で滅ぼせられながらも懸命に生きています。

私は生物研究部員はなんでも生物の中でも主に蜘蛛の研究を中心に活動しています。

蜘蛛と聞くと“嫌いだ”と思う人が大部分だろと思われます。足が8本もある、巣がグロテスクで、それに蜘蛛の網が皮膚に付いたらすこ旨待ちの悪いものです。私はも 初めは蜘蛛についてにはまるで無知で、決して“蜘蛛が好きだ”という者は決していませんでした。でも、色々な蜘蛛を見ているうちにその嫌いがけていく巧みは、變らしい行動にだんだん引きつけられていました。蜘蛛の網… お思いの如く放射状に張られた、いわゆる円網です。でも網にもさまざまな形があり、網を張る蜘蛛も半数を示していること、みんな同じように見える蜘蛛も世界で3万種もいるということをご存じでしょうか。その他にも蜘蛛には驚くべきことが沢山あります。今年の合宿では、真鶴にて、あれ程詳しい事がわかるといつもアツモビシガタゲモを見つて、喜びもひととおり。そして尾瀬の合宿では、そのすばらしい自然に思い切り親しみ、改めて自然の大ささをかみしめた私達でした。

2 夏季合宿報告

その1 尾瀬

(1) 観察植物 □内のものより以下に説明。

鳴侍峠～至仏山～尾瀬ヶ原



シナノキンバイ, タカネトウイリウ, シブツアサツキ,
クルマエリ, ホリバヒナラスユキソウ, イブキジャコウソウ,
ヨウラクソウアズマギク, タカネナデシコ, ヨツババラオガマ,
キバナノコマツメ, タテヤマリンドウ, イワイチョウ, イワカガミ,
イソブルン, ダイモンジソウ, ヒメシャクナゲ, コベイケイソウ,
オゼソウ, ハサンイサギ 等....

尾瀬ヶ原～尾瀬沼

ミズバショウ, フクシゲ, サギスゲ, リュウキンカ, ネコバナ,
サワラン, トキソウ, ミゾガシワ, 七叶草アヤム, カキツバタ,
コニニ古利, ニンコウキスゲ, カワギキョウ, コシケイソウ,
ワレモコウ, ヒツヅササ, オゼコウホネ, モラセンゴケ, コバヤ
ホウシ, オゼヌマアザミ, キンコラカ 等....

尾瀬沼～三平峠

マリバタケヅキ, オゼナス, モツケソウ, クルマエリ, ツゲノハナ
アケボノソウ, オタカラコウ, トンボソウ, フロバナコウゲ,
ヤマキリネノボタン, ミヤマエンレイソウ, ヤナギラン, イワヨウラ
リュウキンカ, ヒメサエリ, ツツジバナ, モミジカラマツ等....





シトノキンバイ

4cmほどの大きさの黄色い花。

黄色の花びら状のものは、花びらでエフル、ガウ片



ホリバヒナウスユキソウ

花は、粉雪をちらりとみてよけに白い色

日本のエーデルワイスにたとえられていい
る。至仙山と谷川岳にしかない
珍品である。



チングルスマ

高さ10cmほどの小さくかわいいらしい
白い花。しかし珍しくない。

実をつけた様子が子供の遊ぶ風車に
似ているところから、種別第一チングルスマ
と呼ばれている。

オゼリウ

花自体はそれ程美しいではないが貴
重品、珍品中の珍品である。至仙山
と、谷川岳にしかないということだけで
なく、木河時代の残存植物である
ということできわめて重要な植物。






ミズバショウ

水辺に群落をつけて咲く。

花のよう見える白い部分は葉が変形したもので「苞」と呼びられ、花はその中にあら黄色の小花がツブツブ。



ニッコウキスゲ


尾瀬の夏の花の代表。

尾瀬が原の木道を歩いていると遠くの方にオレンジ色一面に咲いているのが見られる。花は1日で終わってしまう。



ヒツジグサ

未の刻(午後2時)頃花を開くのでこの名がついたという。が、中には午前11時頃から花を開きはじめるものもある



モウセンゴケ

この群落を遠くから見るとモゼンのよう赤いのでこの名がついて

葉からネベネベして液を出し、小昆蟲などを捕まる。ナガバモウセンゴケは、本州では尾瀬地方にしか見られない。


8/12 真鶴 … ムラクモヒシガタグモについて

(1) 観察のきっかけと観察日


私は 8月12日、13日の1泊2日の予定で真鶴にて合宿を行なひました。そして12日の午後9時頃、夜間観察に出かけられた池田先生が、ムラクモヒシガタグモを見つけられたとのこと。この蜘蛛についてもまだ詳しいことがわかつておらず、網と、捕虫の場面を見ることができただけでも意義があるということを知り、私は小雨の中をこの蜘蛛に集中して観察を始めました。そして合宿終了後も 8月13日、14日(15日)、17日、(22日)、28日 ((1)は池田先生のみ) の6日間にわたって観察をしました。

(2) 造網場所

図1.



四 2



四三




図2はコンクリートで平らに石を埋め込んだものの上に、石を凸凹に埋め込み、ツツジ、シダ、カスケ等の雑草を植えた石垣である。図2が図1を横から見た図で、黒い点はコンクリートと、植物の間に位置している。おもに図1の場所で観察したが、その他にも、図3のようす、金網と地面の間のすき間に、見ることできた。

造網ペイントとの時刻、蜘蛛の個体数は、以下の通りである。

P12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
[8月15日] 午前						♂					
19:00 午後						(♂)	♀				
20:00 午後						(♂)	♀		♀	♂	
21:00 午後			♀	♀					(♀)	♂	
[8月17日]	♀	♀	♀			♂	♀				♀
20:40											

網が観察されたのは、日没から夜明けまで。日中には造網していない。網を張り始めるのは、暗くなりだす午後4時ごろからで、9時までにはほぼ張り終るようだった。そして夜が明ける午前4時頃から網をしまいはじめ、午前8時には、造網している個体は、いなかった。これから、この蜘蛛は夜行性だということが明らかになる。
同心個体が毎晩同じ地点に張るかどうかは不明だが、一度造網して場所を毎晩のうちに変えようすることはほとんどない。

(3) 網の構造とアモの定位

網は基本的にX字型構造で、蜘蛛はXの中心より上や下に定位し第4脚を上の糸にかけ下の糸を各々糸いば(糸を出すところ)、第2脚、第3脚でぶらえている。

図4が腹面から、図5が側面から見た図である。場所によっては図6の場合もある。すなはち、図4の上糸が1本のX字型が、この場合には上糸が2つで2つの高さから下がっている。どういう条件で、この複数字型ができるのか、不明。




図8

糸に絡れたところ、蜘蛛の糸上の糸を
伝て裏方も逃げた。蜘蛛は図8
のように糸をさらに残しておき、
メモリ構造が口元に現さざる。


(4) 高次行動

蜘蛛の体の下からは尾も入れれて体長5mm程度である。
二枚のお出で3mmほどの中には長いアリや、羽虫だった。
虫は下糸の糸と直角に糸に絡れると、粘球(ぬいすり)がある
によって虫は糸に付かり、糸だけでも図10のように上に(?)
上げられる。そして図11のように前脚を使ってみてくる巻
きに付けてしまう。捕獲は1本筋で残っている場合は、図12の
ように、残っている場合は、図13のかこでする。
糸が一本しかない個体は必ずといひ程度捕食中止だ。



（4）蜘蛛の脚筋

工場の下を走るもよろが駆け抜けた30分くらいで蜘蛛の脚筋が網の補修に入る。



次に進むと図14、図15のように動きはじめて筋肉が伸びたり縮むX字型の状態にもどるが、下條の力の方だけ作ってX字の中にいて一時休むこともある。

図14、図15では、左右に動いている。これは暗い中で観察していくとすると掌中の方向のほうが左側にするほど動きはしているように見えるが、これが糸をのばすから、左右に動き、糸中の位置を確かめているようだ。

そして地中から下へ直ぐに下の地面へみいる。地面へつと
図16のからこうでおりを地面に2.3度づける。そして、中心に
とり、ゼンカの下糸をX字の中心に定位する。この間の
所要時間は、1分以内。あるいは間の行動だった。

(6) 組織行動

図17



図18



組合には2行動を見ている。蜘蛛が足を下に垂れて
うさぎ走っているように見えることがある。

これは仰向けにおいて、第4脚を使って糸を流しているのに。
図17は若から、図18は網を張っている途中糸にから下が
て流す時の図である。糸を流す時に第4脚を使うのは
このムラクモヒラガタケモノの特徴的な行動で、他の蜘蛛
にはあまり見られない。糸にて糸がどこかにつくと、
蜘蛛は図17の③のように姿勢を立てよし、第4脚で
その上に巣合を確立するかのような動作をして、糸にて糸が
あると引きよせて、それを張るようになる。

(7) 遊び行動

本種ムラクモヒラガタケモノは巣間に隠れに潜り、日没(暗い時)の時に頭部に手を葉先に止めて糸を流して巣に本の
糸を張る。(図19のA,B)



次に左右に糸を動かして糸の長さを確認する(C)


その後 D の図のように下に下がる前に、同時に張った糸を切っておいたか、糸とのひすからである。その証拠に、でき上がった X 字の上糸に、そのつなぎ目が見られる。(L)

糸とのひすて蜘蛛はまん中の位置を確かめ、まばぐちに下へ下りる (F)。その後は、補修の時と同じだけ、図丁のまきじは下糸が平行で、X字にてとらつよい。そこで蜘蛛は図 K のように、第一脚で上糸をよせ3か、第四脚で交点をとぐりよせる。

30

図 18






(8) 交尾行動

蜘蛛の交尾は 場合によりては、オスが食べられてしまうという危険があるが、幸い2回も観察することができた。

まず、オスとメスの区別を記しておく




オスは触肢の先端がくらんでる
のが、メスにはっきりしている。

オスの方がメスよりスマートで
小さい。


メスの方が個体数は多い。
要點にオスの触肢をメスの外陰器
へ当てる。

雌雄の接近、干渉



1本の線上で(ゆくり)
近づき、近づいたり
けつけたりを何
度か。
オスは第一脚で
メスに信号を送る
(H)


插入




拒絶



雌雄ともに仰向干の姿
勢でオスはえびどうぐ
の小峰頭に5. (回) 当てる。
一度打たれてから再び
その行動をし、又が
糸の上に来たときに
オスが逃げ、交尾は終
了した。



1.



HとIの図は2回目の観察で見られたものである。

オスはメスに近づく際、図Hのように糸を第一脚で
はじいて信号を送ります。

插入の仕方は前回Hと異なり、僅1分間に重ね合
う所を感じさせない2回往復か、2回でうちの2
2本重複触肢を1本ずつ挿入する事が見られる。
挿入が終わるとメスは糸を切り、ひざは左足にわざ
れています。

(9) あとがき

ムラクモヒラザタケモは夜にしか現れないということで
複数回の観察に行こうかどうか迷ったこともあり
ました。しかし、徐々にこの蜘蛛は興味
深い行動をしてくれて、行なうからにはいた
生物研究者には、いつか蜘蛛の図鑑を作
ることの大好きな夢があります。

まだ蜘蛛の研究を始めたから3年目。

これからもと前述したとおりをめざすのが今後の
目標です。

私たちの発表を見た方にもお手元に蜘蛛


に興味を持っていていただけたら、私達としては
とてもうれしく思います。

生物研究部員

2年3組	山口 泉
4組	小川 美津み
5組	島津 千秋
7組	鶴田 明子
8組	田村 武子

顧問

池田 博明	先生
稻葉 茂代	先生



小田原城内高校(本校)内で採集された蜘蛛(1980.4~1982.9)

- | | | |
|----------------|------------------|-----------------|
| ○トタテグモ科 | 23. オオサカアカムネグモ | ○コモリグモ科 |
| 1. キシナウエトタテグモ | ○コネグモ科 | 50. ハジキコモリグモ |
| ○シグモ科 | 24. イミサワオニグモ | 51. チビコモリグモ |
| 2. シグモ | 25. ニイグモ | ○ササグモ科 |
| ○ハグモ科 | 26. コゲチャオニグモ | 52. ササグモ |
| 3. ハグモの一種 | 27. ハナオニグモ | ○カニグモ科 |
| ○ウズグモ科 | 28. ナリオニグモ | 53. ハナグモ |
| 4. マネキグモ | 29. ヤマシロオニグモ | 54. エビグモ |
| チリグモ科 | 30. サツマノミダマシ | 55. アサヒエビグモ |
| 5. チリグモ | 31. シロスジショウショウグモ | 56. ガザミグモ |
| ○ヤマヨログモ科 | 32. カラフトオニグモ | 57. シャコグモ |
| 6. トグモ | 33. チエウガタコガネグモ | 58. セマルトラフカニグモ |
| 7. ユカタマシヒグモ | 34. ナガコガネグモ | 59. ヤミイロカニグモ |
| ○ユウレイグモ科 | 35. コサタコガネグモ | ○ハエトリグモ科 |
| 8. シモングモ | 36. ヤマトカナエグモ | 60. ネコハエトリ |
| ○ヒメグモ科 | 37. ゴミグモ | 61. カラスハエトリ |
| 9. キヒメグモ | 38. ショロウグモ | 62. イナヅマハエトリの一種 |
| 10. オオヒメグモ | ○アシナガクモ科 | 63. マミシロハエトリ |
| 11. アシプロヒメグモ | 39. シロカネグモの一種 | 64. デニツツハエトリ |
| 12. シモフリミシングモ | 40. ヤサザギタシナガグモ | 65. チャイロアサヒハエトリ |
| 13. カレハヒメグモ | 41. アシトガグモ | 66. ヨダンハエトリ |
| 14. ハラクモヒシガタグモ | ○ヒラタグモ科 | 67. アリグモ |
| 15. ハラギヒメグモ | 42. ヒラタグモ | 68. チャスジハエトリ |
| 16. ヒメグモ | ○タナグモ科 | 69. ミスミハエトリ |
| 17. ヤホシヒメグモ | 43. クサグモ | 70. アオオビハエトリ |
| 18. ハイイロヒメグモ | 44. コクサグモ | ○フクログモ科 |
| 19. タカユヒメグモ | 45. シモフリヤチグモ | 71. カバキコマキグモ |
| ○サラグモ科 | 46. メガネヤシグモ | 72. トビイロフクログモ |
| 20. ヘリシロサラグモ | 47. ヤマヤシグモ | 73. ムナヤカフクログモ |
| 21. ムネグロサラグモ | ○キニダグモ科 | 74. ウラシマグモ |
| ○コサラグモ科 | 48. イオウイロハシリグモ | 75. ヤバネウラシマグモ |
| 22. チビアカサラグモ | 49. アズマキシググモ | 76. ネコグモ |

○ アシダカグモ科

77. アシダカグモ

○ ミボグモ科

78. ミボグモ

○ ワニグモ科

79. ヤクロワニグモ

以上 22科 79種