


東京蜘蛛談話会会誌

# KISHIDAI A

No. 15



東京蜘蛛談話会

東京都日野市豊田1,896 萱鳴泉方

PHONE : 0425 - 81 - 7128

# クモの名称(Ⅲ) ——昔の名前・今の名前——

新 海 栄 一

## 凡 例

1. 和名( )内は旧名及び異名。=の後の学名は以前使用されていた学名(転用される前の学名及びシノニムとなつたもの)である。ただし属が何回も変更になつた種については、日本産蜘蛛類(岸田久吉、1913~1914)以後の属しか記していない。
2. 科の配列は原色日本蜘蛛類大図鑑 増補改訂版(八木沼健夫、1968)の日本産真正くも類分類表に従つた。
3. 1960年以前の文献において属が現在のものと大幅に異つている種については、特に旧属名を先に記して、各科の終りに載せておいた。(→で示したものである。)
4. 学名は1970年2月1日現在である

(第2報追加)

DICTYNIDAE	ハグモ科
Dictyna foliicola BOES. et STR.	ヒナハグモ(ミドリハグモ)
ULOBORIDAE	ウズグモ科
Uloborus defectus BOES. et STR.	ハラクロウズグモ(ヒカゲグモ)
U. incognitus DOEN. et STR.	マエカケウズグモ(ミナミウズグモ)
コウズグモの後にヤジロウズグモを加える。	
THERIDIIDAE	ヒメグモ科
Achaearanea (?) asiatica (BOES. et STR.)	メダマヒメグモ(メダマグモ・チヂグモ・キヒメグモ)
=Achaea asiatica BOES. et STR.	

## 第 3 報

THERIDIIDAE	ヒメグモ科
Dipoena caninotata BOES. et STR.	アカクロミジングモ(コケミジングモ)
D. flavomarginata BOES. et STR.	キベリミジングモ(コガネミジングモ・キアシミジングモ)
D. longisternum BOES. et STR.	ムナボソミジングモ(ムネナガミジングモ)
D. mutilata BOES. et STR.	コアカクロミジングモ(カワリミジングモ)
D. mustelina (SIRON)	カニミジングモ
=Euryopis mustelina SIRON	カニヒメグモ(ワキメグモ)

KISHIDAIA. No. 15. 1970. Mar.

<i>Enoplognatha dorsinotata</i> BOES. et STR.	セマダラコノハグモ(セマダラコノハヒメグモ)
<i>E. japonica</i> BOES. et STR.	ヤマトコノハグモ(ヤマトヒメグモ・コノハグモ)
<i>E. transversifoveata</i> (BOES. et STR.)	カレハヒメグモ
= <i>Teutana transversifoveata</i> BOES. et STR.	カレハグモ(モチイグモ)
<i>Episinus affinis</i> BOES. et STR.	ヒシガタグモ(コケヘラヒメグモ)
<i>E. caudifer</i> DOEN. et STR.	ハラナガヒシガタグモ(ハラナガヘラヒメグモ)
<i>Hyptimorpha mirabilis</i> BOES. et STR.	オナガヒメグモ(オヒキクモ・エハラグモ)
<i>Phoroncidia pilula</i> (KARSCH)	ツクネグモ
= <i>Sutlabe pilula</i> KARSCH	
= <i>Theridion p.</i> (KARSCH)	ホシヒメグモ
= <i>Gasteracantha sagaensis</i> BOES. et STR.	
= <i>Ulesanis sagaensis</i> (BOES. et STR.)	
= <i>Oronota pilula</i> (KARSCH)	
<i>Phomphaea sagana</i> (DOEN. et STR.)	ヤリグモ(サガヤリグモ)
= <i>Ariamnes saganus</i> DOEN. et STR.	サガオナガクモ(シリトガリ)
= <i>Bellinda nipponica</i> KISHIDA	ベリンダイソウロウグモ(オナガイソウロウグモ)
<i>Steatoda abrupta</i> (KARSCH)	カガリグモ(ハナダカアブラグモ)
= <i>Linyphia abrupta</i> KARSCH	
= <i>Stearoelea a.</i> (KARSCH)	
<i>S. albilunata</i> (SAITO)	ハンゲツオスナキグモ
= <i>Asagena albilunata</i> SAITO	
= <i>Tylorida pulcher</i> YUHARA	コガネマル
= <i>Lithyphantes cavernicola</i> BOES. et STR.	ツリガネヌサグモ
= <i>Steatoda cavernicola</i> (BOES. et STR.)	ツリガネグモ
<i>Steatoda cavernicola</i> (BOES. et STR.)	は以前より成体が採集されず、 <i>Steatoda</i> の疑問種とされていたが、筆者は昨年 <i>S. cavernicola</i> を飼育観察した結果 <i>S. albilunata</i> (SAITO) の幼生期の個体であることを確認したため (KISHIDAIA No.9. ハンゲツオスナキグモの幼生の斑紋について。参照)、ここにあらためて <i>S. cavernicola</i> を <i>S. albilunata</i> のシノニムとする。
	尚以前に大河内氏採集の <i>S. cavernicola</i> の標本同定を八木沼氏に依頼した際に、本種は <i>S. a - lbilicola</i> の幼生ではないか?との私信をいただいている。
<i>S. grossa</i> (C. KOCH)	シロホシヒメグモ
= <i>Teutana grossa</i> C. KOCH	
<i>S. japonica</i> (DOEN. et STR.)	オスナキグモ
= <i>Asagena japonica</i> DOEN. et STR.	アカオスナキグモ(フアカオスナキグモ)
<i>S. septemmaculata</i> (KEYSERLING)	ナナホシヒコグモ
= <i>Lithyphantes septemmaculatus</i> KEYSERLING	ナナホシヌサグモ
<i>S. minus</i> (DOEN. et STR.)	コヌサグモ

= <i>Lithyphantes minus</i> DOEN. et STR.	(モミジヌサクモ)
S. <i>albimaculosa</i> (SAITO)	ブチモタイグモ
= <i>Teutana albimaculosa</i> SAITO	(ブチカレハグモ・ブチツヅレグモ)
<i>Theridion angulithorax</i> BOES. et STR.	ツリガネヒメグモ(ムネサンカクヒメグモ・ ワキクロヒメグモ)
T. <i>argyrodiiforme</i> BOES. et STR.	アミメヒメグモ(ハラジロヒメグモ)
T. <i>ferrumequinum</i> BOES. et STR.	ヒザブトヒメグモ(オンマヒメグモ)
T. <i>hilgendorfi</i> KARSKH	ヤツデヒメグモ(ヒルゲンドルフヒメグモ)
T. <i>japonicum</i> BOES. et STR.	ヒメグモ(ミツシロボシヒメグモ・ヤマトヒ メグモ)
T. <i>kompirense</i> BOES. et STR.	コンビラヒメグモ(ミツクロボシヒメグモ・ キヨヒメグモ)
T. <i>lunatum</i> (CLERCK)	カクヤヒメグモ(タリクヒメグモ)
=T. <i>formosum</i> (CLERCK)	
T. <i>mneon</i> BOES. et STR.	ハラオビヒメグモ(コウマヒメグモ)
T. <i>meum</i> BOES. et STR.	チビヒメグモ(コウマヒメグモ)
T. <i>octomaculatum</i> BOES. et STR.	ヤホシヒメグモ(ト[ウ]ホシヒメグモ・ア オヒメグモ)
T. <i>pinastri</i> L. KOCH	ムナクロヒメグモ(セオビヒメグモ・セスジ ヒメグモ)
T. <i>rapulum</i> YAGINUMA	ギボシヒメグモ
= <i>Narihira dericata</i> KISHIDA (MS)	ナリヒラクモ
=N. <i>niger</i> KISHIDA (MS)	クロナリヒラクモ
=N. <i>maculata</i> KISHIDA (MS)	ホシクロナリヒラクモ
=N. <i>fasciata</i> KISHIDA (MS)	シマナリヒラクモ
T. <i>sterninotatum</i> BOES. et STR.	ムナボシヒメグモ(ナガレボシヒメグモ)
T. <i>subatulatum</i> BOES. et STR.	コケヒメグモ(ハリアカヒメグモ)
T. <i>subpallens</i> BOES. et STR.	ハイイロヒメグモ(キクロヒメグモ)
T. <i>surfabides</i> BOES. et STR.	ヨツコブヒメグモ(ジュズカケグモ)
T. <i>yunohamense</i> BOES. et STR.	ユノハマヒメグモ(ムナキヒメグモ)
<i>Comaroma maculosum</i> OI	ヨロイヒメグモ(カノコクモ)
<i>Enoplognatha margarita</i> YAGINUMA	シロタマヒメグモ(シロタマクモ)

*Argyrodes crucinotum* BOES. et STR.

ケムリイソウロウクモ(ツクシイソウロウク  
モ)

→*Leucauge crucinota* (BOES. et STR.)

チビシロカネグモ(ケムリシロカネグモ)

A. *yesoensis* SAITO

エゾイソウロウクモ

→*Uloborus yesoensis* (SAITO)

エゾウズクモ

*Bellinda nipponica* KISHIDA

ペリンダイソウロウクモ(オナガイソウロウ  
クモ)

→*Rhomphaea sagana* (DOEN. et STR.)

ヤリクモ

KISHIDAIA. No 15. 1970. Mar.

<i>Enoplognatha crassipes</i> BOES. et STR.	アシプトコノハヒメグモ: アシプトコノハグモ
E. <i>foliicola</i> DOEN. et STR. → <i>Anelosimus crassipes</i> (BOES. et STR.)	コノハヒメグモ アシプトヒメグモ
Lithyphantes dubius DOEN. et STR. → <i>Araneus ejusmodi</i> BOES. et STR.	ヌサグモ ヌサオニグモ
Narihira spp. → <i>Theridion rapulum</i> YAGINUMA	ナリヒラクモ属 ギボシヒメグモ
Nusa dubia (DOEN. et STR.) → <i>Araneus ejusmodi</i> BOES. et STR.	ヌサグモ ヌサオニグモ
Theridion higense DOEN. et STR. → <i>Anelosimus crassipes</i> (BOES. et STR.)	アカヒメグモ アシプトヒメグモ
Tylorda pulcher KISHIDA (YUHARA) → <i>Steatoda albilunata</i> (SAITO)	コガネマル ハンゲツオスナキグモ
NESTICIDAE	
<i>Nesticus akiyoshiensis</i> (UYEMURA) = <i>Theridion akiyoshiensis</i> UYEMURA	ホラヒメグモ科 アキヨシヒメグモ
N. <i>floronooides</i> (KOMATSU) = <i>Cyclocarcina floronooides</i> KISHIDA (KOMATSU)	ホシクロコウマルヒメグモ ホシクロコウマルサラグモ
N. <i>linyphoides</i> (KOMATSU) = <i>Suntorypha linyphoides</i> KOMATSU	ミヨウジンヒメグモ
N. (?) <i>oculiprominentis</i> SAITO	デメキリヒメグモ(デメキリクモ)
LINYPHIIDAE	
<i>Floronia bucculenta</i> (CLERCK) = <i>Bolyphantes frenatus</i> (WIDER) = <i>Linyphia exornata</i> L. KOCH; SAITO	サラクモ科 ハナサラグモ サラグモモドキ シロサラグモ
<i>Arcuphanates ashifuensis</i> (OI) = <i>Fusciphantes ashifuensis</i> OI	アシフヤミサラグモ アシフヤミクモ
A. <i>longiscapus</i> (OI) = F. <i>longiscapus</i> OI	ナガエヤミサラグモ ナガエヤミクモ
A. <i>osugiensis</i> (OI) = F. <i>osugiensis</i> OI	オオスギヤミサラグモ オオスギヤミクモ
A. <i>septentrionalis</i> (OI) = F. <i>septentrionalis</i> OI	キタヤミサラグモ キタヤミクモ
A. <i>tamaensis</i> (OI) = F. <i>tamaensis</i> OI	タマヤミサラグモ タマヤミクモ
A. <i>troglodytarum</i> (OI) = F. <i>troglodytarum</i> OI	ホラヤミサラグモ ホラヤミクモ
A. <i>yamakawai</i> (OI) = F. <i>yamakawai</i> OI	ヤマカワヤミサラグモ ヤマカワヤミクモ
<i>Linyphia albolimbata</i> KARSCH	ヤガスリサラグモ

=L.	permata	OI	
L.	brongermai	(HELDINGEN)	コヘリジロサラクモ
=L.	limbatinella	: OI nec BOES. et STR.	(チビサラクモ)
L.	clathrata	S UNDEVALL	コウシサラクモ(カキネサラクモ)
L.	oidedicata	(HELDINGEN)	ヘリジロサラクモ
=L.	albolimbata	: BOES. et STR. nec KARSCH	(ワキグロサラクモ)
L.	hortensis	S UNDEVALL	アササラクモ
=L.	pratensis	: BLACKWALL nec WIDER	
L.	montana	(CLERCK)	ヤマジサラクモ(ヤマサラクモ)
Microlinyphia pusilla	(S UNDEVALL)	オクチサラクモ	
=Linyphia pusilla	S UNDEVALL		
Prolinyphia emphana	(WALCKENAER)	タイリクサラクモ	
=Linyphia emphana	WALCKENAER		
P.	limbatinella	BOES. et STR.	フタスジサラクモ
=P.	bilineata	OI	
P.	longipetella	(BOES. et STR.)	アシナガサラクモ
=Linyphia longipedella	BOES. et STR.		
P.	marginata	(O. KOCH)	シロブチサラクモ
=L.	marginata	O. KOCH	(サラクモ)
P.	yunohamensis	(BOES. et STR.)	ユノハマサラクモ
=L.	yunohamensis	BOES. et STR.	
Neolinypbia angulifera	(SCHENKEL)	ハンモツクサラクモ	
=Linyphia peltata	: SAITO, YAGINUMA et al. nec WIDER		
=Neolinypbia p.	: OI et al. nec WIDER	(キタサラクモ・オイシサラクモ)	
ヤガスリ・コヘリジロ・ヘリジロ・フタスジ・ハンモツクサラクモの学名については八木沼氏により詳報されている。(A typus, №53, pp. 46~47. 「サラクモ属の改訂された学名」) Stranskella quadrimaculata (UYEMURA) ヨツボシサラクモ			
=Oedothorax quadrimaculatus	UYEMURA	ヨツボシアカムネグモ	
Solenysa mellotteei	SIMON	アリマネグモ(ヤミヌカグモ)	
Tapinopa longidens	(WIDER)	ナガバカナコキグモ(カナコギグモ)	
MICRYPHANTIDAE		コサラグモ科	
Apriflontaria mascula	(KARSCH)	コサラグモ(シシスカグモ)	
=Erigone mascula	KARSCH		
=Microneta m.	(KARSCH)		
Dipocephaloidea saganus	(BOES. et STR.)	ハラジロムナキグモ(ツノタテグモモドキ)	
=Dipocephalus saganus	BOES. et STR.	ノコギリヒザクモ(ノコギリクモ)	
Erigone prominens	BOES. et STR.	ノコギリヒザグモ(ノコギリクモ)	
Gonathonarium dentatum	(WIDER)	ニセアカムネグモ(キダチアカムネグモ)	
=G. exsiccatum	(BOES. et STR.)		
=Oedothorax e.	BOES. et STR.		
=O. dentatus	(WIDER)	(ムナキグモ)	
Nematogmus sanguinolentus	(WALCKENAER)	チビアカサラグモ(アカサンダグモ)	
		KISHIDAIA. №15. 1970. Mar.	

<i>N. stylitus</i> (BOES. et STR.)	ズダカグモ(クロハラサナダグモ)
<i>Oeophorax tokyoensis</i> (UYEMURA)	トウキヨウアカムネグモ
= <i>Erigone tokyoensis</i> UYEMURA	コブグモ(コブアカムネグモ)
MIMETIDAE	センショウグモ科
<i>Ero japonica</i> BOES. et STR.	センショウグモ(ツノセンショウグモ)
SYMPHYTOGNATHIDAE	ヨリメグモ科
<i>Conoculus lygadinus</i> KOMATSU	ヨリメグモ(リュウガヨリメグモ)

## クモの同定ポイント(1)

*Theridion tepidariorum* C. Koch オオヒメグモ  
(= *Achaearanea tepidariorum* (C. Koch))

### 〔形態〕♀

体長7~8 mm。頭胸部は長さ>幅、第2・3歩脚間で最広。中窩は横長で不明瞭、放射溝・頸溝いずれも不明瞭(頸溝の方がやや明瞭)。背甲は平であるが、眼域はやや突出し、眼域の下は凹む。前中眼最大、前中眼間>前中側眼間、後眼はほぼ等大、後中眼間<後中側眼間、中眼域は方形で、前辺>後辺、側眼は接する。上顎と分は小さく、前牙堤に2歯を有する。下唇は幅>長さで下顎の分を越えない。触肢には爪があり、6歯を有する。胸板は長さ>幅、第1脚間最広で、第4脚に近づくほど細くなる。第4脚間にわずかに挿入し鈍くとがる。歩脚には3爪があり歯を有する。第4脚跗節に鋸歯状毛がならぶ、脚式は1・4・2・3。

腹部は球形に近く(糸疣の位置を口にした風船玉状をしている)、糸疣には間疣を欠き、これに代わる2刺毛もない。

### 〔色彩〕

頭胸部は褐色の地に黒色の網目状斑を有する。上顎は橙黄色の地に褐色の幅の広い条がある。下唇は橙黄色。下顎・胸板は淡褐色。歩脚は淡橙黄色であるが、腿節・胫節・蹠節の先端及び膝節に褐色の輪紋を有する。触肢は淡橙黄色。

腹部は個体による色彩の変化が大きく、黒色型・褐色型・緑色型・灰白色型などがあり、それらの地に黒色・白褐色・黄色・橙色などの複雑な斑紋をもつてゐる(黒色の地に白色の点斑と山形斑のあるもの、白色の地に黒色斑を持つたものなど)。

### 〔生態〕

屋内や周囲に多く生息し、不規則な立体網(通常不規則網と呼ばれる)を張り、最上部(あるいはやや下方)に平行背位に占座することが多い。幼生期は、アヤトリ状の籠網を張り中心に占座する。野外では樹下・洞穴・樹の根元などにみられ、個体により幼生以外でも籠網に近いものをつくり、中心に占座している。また、野外性のものでは、木の葉や土の塊などを占座点に吊し、屋根にしているものを良くみかける。

オオヒメグモの生態については ATYPUS No.28 pp. 1-3, 1963 の中平清氏の論文、学名については、八木沼健夫氏の「日本産真正蜘蛛類の科・属・種の検討」東亜蜘蛛学会、1961を参照されたい。

### 図 版 説 明

1. 3. 磐梯高原 (福島県) 1965年8月 (松本原図)
2. 養沢 (東京都) 1967年7月 (新海原図)
4. 大宮 (埼玉県) 1970年5月 (大河内原図)
5. 沼津 (静岡県) 1969年7月 (小野原図)
6. 台中 (台 湾) 1969年8月 (新海原図)
7. 多摩プラザ (東京都) 1969年5月 (国見原図)
8. 大島 (東京都) 1968年10月 (大河内原図)

---

KISHIDAIA No.15

1970年3月20日 印刷

1970年3月21日 発行


東京蜘蛛談話会

▼191 東京都日野市豊田1896

萱嶋 泉方

PHONE 0425(8)7128

---



KISHIDAIA NO. 15